

РУКОВОДСТВО ПО НАЗНАЧЕНИЮ

хлоргексидина и линейки Prevent* с постбиотиками

В РАЗЛИЧНЫХ КЛИНИЧЕСКИХ СИТУАЦИЯХ

ПАЦИЕНТ С ИМПЛАНТАТОМ				
	ХЛОРГЕКСИДИН		PREVENT	
КЛИНИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ	0,20% или 0,12% ополаскиватель для полости рта, зубная паста, гель 0,5%	0,05% ополаскиватель для полости рта, зубная паста	ополаскиватель для полости рта, зубная паста и гель	ПРИМЕЧАНИЯ
ИМПЛАНТАЦИЯ				Хлоргексидин в качестве вспомогательного средства перед хирургическим вмешательством, перед операцией и до снятия швов. ¹ Линейка PREVENT с постбиотиками, используемая после хлоргексидина, в качестве вспомогательного средства при ежедневной гигиене полости рта в период временных реставраций и остеоинтеграции. ²
НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ПАЦИЕНТАМИ С ПОСТОЯННЫМИ РЕСТАВРАЦИЯМИ И ПЛАНОВЫЕ ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ ВИЗИТЫ				Линейка PREVENT с постбиотиками рекомендована для ежедневной гигиены полости рта.
МУКОЗИТ				Хлоргексидин является вспомогательным средством при активном лечении мукозита. Рекомендуется использовать гель для локального применения, а ополаскиватель и зубную пасту для всей полости рта. ¹ Гель, зубная паста и ополаскиватель Prevent с постбиотиками показаны только для поддерживающей терапии при оптимальной гигиене полости рта. ²
ПЕРИИМПЛАНТИТ				Хлоргексидин является вспомогательным средством при активном лечении периимплантита. Рекомендуется использовать гель для локального применения, а ополаскиватель и зубную пасту для всей полости рта. ¹ Хлоргексидин 0,05% можно рекомендовать в качестве бактериостатического средства, по крайней мере, в течение периода наблюдения за пациентом. Постбиотики можно назначить после применения хлоргексидина для восстановления зубиоза. ³

1 – Хлоргексидин следует назначать в активной фазе и при наличии клинических признаков воспаления.

2 – Линейка PREVENT (гель, ополаскиватель для полости рта и зубная паста) показана только пациентам с оптимальным контролем зубного налета и может назначаться на ежедневной основе. Рекомендуется для поддерживающей фазы, не назначать для активной фазы.

3 – Высокие концентрации хлоргексидина, такие как 0,20% и 0,12%, классифицируются как бактерицидные препараты, тогда как препараты с хлоргексидином 0,05% обладают бактериостатическим действием, и их применение может быть продлено до 6 месяцев. Продукция с хлоргексидином 0,05% эффективна для контроля зубной биопленки умеренной выраженности и может применяться в качестве альтернативы продукции линейки PREVENT.

ПАЦИЕНТ С ПАРОДОНТИТОМ				
	ХЛОРГЕКСИДИН		PREVENT	
КЛИНИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ	0,20% или 0,12% ополаскиватель для полости рта, зубная паста, гель 0,5%	0,05% ополаскиватель для полости рта, зубная паста	ополаскиватель для полости рта, зубная паста и гель	ПРИМЕЧАНИЯ
СТАБИЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ПАЦИЕНТА С ПАРОДОНТИТОМ (ЗДОРОВЫЙ ПАЦИЕНТ)				Линейка PREVENT для непрерывного использования, если контроль зубного налета оптимален. ²
ПАЦИЕНТ С РЕЦИДИВОМ ПАРОДОНТИТА				Хлоргексидин является вспомогательным средством при активном лечении рецидивов пародонтита. Рекомендуется использовать гель для локального применения, а ополаскиватель и зубную пасту для всей полости рта. ¹
ПОСЛЕ ПЕРЕОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ ТКАНЕЙ И В КАЧЕСТВЕ ПОДДЕРЖИВАЮЩЕЙ ТЕРАПИИ				Линейка PREVENT для регулярного/длительного применения на этапе поддерживающей терапии при оптимальном контроле биопленки, предотвращает реколонизацию пародонтопатогенными микроорганизмами. ²

1 – Хлоргексидин следует назначать в активной фазе и при наличии клинических признаков воспаления.

2 – Линейка PREVENT (гель, ополаскиватель для полости рта и зубная паста) показана только пациентам с оптимальным контролем зубного налета и может назначаться на ежедневной основе. Рекомендуется для поддерживающей фазы, не назначать для активной фазы.

ДРУГИЕ ТИПЫ ПАЦИЕНТОВ				
	ХЛОРГЕКСИДИН		PREVENT	
КЛИНИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ	0,20% или 0,12% ополаскиватель для полости рта, зубная паста, гель 0,5%	0,05% ополаскиватель для полости рта, зубная паста	ополаскиватель для полости рта, зубная паста и гель	ПРИМЕЧАНИЯ
	ПАЦИЕНТ С ВОСПАЛЕНИЕМ		ПОДДЕРЖАНИЕ ЗДОРОВЬЯ ПАЦИЕНТА	
КУРИЛЬЩИК				Хлоргексидин в качестве вспомогательного средства в активных фазах состояния. ¹ Курение изменяет зубиоз полости рта и считается фактором риска для развития пародонтита/периимплантита.
ПАЦИЕНТ С ДИАБЕТОМ И/ИЛИ С СИСТЕМНЫМ ЗАБОЛЕВАНИЕМ				Хлоргексидин в составе комплексной терапии в активной или этиотропной фазе лечения ¹ , хлоргексидин 0,05%, когда требуется поддерживающее бактериостатическое действие ³ , и линейка PREVENT при отсутствии признаков воспаления и оптимальном контроле зубного налета. ²
КСЕРОСТОМИЯ				Несмотря на то, что он не является заменой слюны, линейка PREVENT помогает противодействовать изменениям в полости рта, связанным с этой клинической ситуацией. Линейку PREVENT следует использовать непрерывно, особенно гель, для облегчения симптомов.
ПАЦИЕНТ С ИММУНОДЕФИЦИТОМ				Линейку PREVENT рекомендуется использовать на ежедневной основе, особенно гель, для облегчения симптомов, два раза в день.
СТОМАТИТ				Линейка PREVENT не показана. Хлоргексидин противодействует бактериальному компоненту воспаления. ¹
ПАЦИЕНТ С ГИПЕРЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬЮ, С ВЫСОКИМ РИСКОМ РАЗВИТИЯ КАРИЕСА Линейка BIOSMALTO не должна рассматриваться как альтернатива линейке PREVENT, но может использоваться в сочетании с ней, если необходимо вмешательство не только в контроль микробиоты полости рта, но и в лечение любых патологических состояний. Линейка BIOSMALTO – это линейка продуктов, предназначенных для профилактики и лечения пациентов с выраженной чувствительностью, кариесом и проблемами твердых тканей зубов.				

1 – ХЛОРГЕКСИДИН следует назначать в активной фазе и при наличии клинических признаков воспаления.

2 – Линейка PREVENT (гель, ополаскиватель для полости рта и зубная паста) показана только пациентам с оптимальным контролем зубного налета и может назначаться на ежедневной основе. Рекомендуется для поддерживающей фазы, не назначать для активной фазы.

3 – Высокие концентрации хлоргексидина, такие как 0,20% и 0,12%, классифицируются как бактерицидные препараты, тогда как препараты с хлоргексидином 0,05% обладают бактериостатическим действием, и их применение может быть продлено до 6 месяцев. Продукция с хлоргексидином 0,05% эффективна для контроля зубной биопленки умеренной выраженности и может применяться в качестве альтернативы продукции линейки PREVENT.



*Превент - название линейки средств гигиены полости рта от торговой марки Curasept